MEET THE MASTER · WEBINAR SERIES

# 與大師有約　線上會議



演講醫師 —— SPEAKER

## 林詠萱　醫師

台北榮民總醫院．神經內科部 ．主治醫師
國立陽明交通大學 腦科學研究所 博士生

## SUBJECT

*「失智症用藥怎麼調？*
*ChEIs 用量、副作用與行為症狀的門診決策」*

**DATE / TIME**
**2027.01.19 (星期二)**
12:30 - 13:30
民國 116 年 01 月 19 日

**VENUE**
**線上會議**
On-Line Meeting

**ACCRADIATION**
**持續教育學分**
台灣神經學學會
台灣臨床失智症學會
台灣老年精神科醫學會

**SCIENTIFIC PROGRAM 議程**

- 12:30 – 12:40　**開場** OPENING
- 12:40 – 13:20　**專題演講** KEYNOTE LECTURE
- 13:20 – 13:30　**Q&A．閉幕** DISCUSSION & CLOSING

MEETING LINK ．掃碼加入

『僅限醫療專業人員參閱』
『本活動僅限醫療專業人員參加』
『本公司不會為同行者安排行程、支付或補貼其任何費用及支出』

東竹藥品股份有限公司

EXELON 憶思能貼片 EXELON PATCH (rivastigmine transdermal system)

# 處方資訊摘要（ Exelon® rivastigmine簡易仿單資訊）

PRESCRIPTION INFORMATION

處方資訊摘要
本藥須由醫師處方使用。
**愷思能膠囊 1.5mg/3.0mg/4.5mg/6.0 mg**
**Exelon® Capsules（rivastigmine）1.5mg/3.0mg/4.5mg/6.0 mg**
衛署藥輸字第 022861、022858、022863、022859號

適應症
**輕度至中度阿滋海默氏病之失智症。與帕金森氏症相關的輕度至中度失智症。**
劑量與用法用量
一日服用兩次，可在早餐及晚餐後或一起服用。推薦起始劑量為1.5 mg一天兩次，服用至少兩週後，若耐受性佳，可增加到3mg一天兩次。再兩週後增加到4.5mg一天兩次，再兩週後增加到6.0mg一天兩次。任何劑量的增加都必須是在病患服用現有劑量至少已兩週且表現良好的耐受性情況下。每日最高建議劑量為6mg一天兩次。如果病患中止服藥超過3天後，若想重新服藥時，應從最低1.5mg重新調整起，每隔兩週逐漸增加到中止藥物前有良好耐受性的劑量。

禁忌
禁用於已知對rivastigmine、其他carbamate衍生物或配方中的賦形劑有過敏病史之病人。嚴重肝功能損害族群的研究尚未建立，故不可使用本品於該一族群之病人。過去曾出現黏貼部位反應病史，疑似對rivastigmine穿皮貼片具過敏性接觸性皮膚炎。
警語及注意事項/不良反應
Exelon的治療一定要從最低劑量1.5mg一日服用兩次開始，每隔兩週逐漸增加到維持劑量。如果中止服藥超過3天後重新服藥時，應重新從最低劑量開始，以減少如嚴重嘔吐之不良反應發生。
剛開始進行治療及/或增加劑量時，可能會引起胃腸道不適，如噁心、嘔吐及腹瀉。此類副作用可能會隨劑量降低而減少。
阿滋海默氏病病人在服用Rivastigmine等膽鹼酯酶抑制劑時，體重可能會降低。因此，在Exelon治療期間，需監測病人的體重。
如同其他的擬膽鹼作用劑（cholinomimetics）一樣，應注意病人是否本身已有房實節疾病症候群（sinus syndrome）或是心臟傳導障礙（conduction defects）【如竇房的傳導阻礙（sino-atrial block），房室的傳導阻礙（atrio-ventricular block）】，此時應小心。
如同其他的擬膽鹼作用劑一樣，對於有氣喘（asthma）、肺阻塞性（obstructive pulmonary）病史的病人使用 Exelon 必須小心。
如同其他的擬膽鹼作用劑一樣，Rivastigmine可能會誘發或惡化錐體外症候群。帕金森氏症之失智症病人以Exelon膠囊治療時，曾出現帕金森氏病之症狀(特別是顫抖)惡化情形。
臨床上有明顯腎臟或肝臟功能損害者，可能會出現較多不良反應。
Rivastigmine於起始治療或劑量增加時，可能導致患者感到頭暈及嗜睡。因此，Exelon治療失智症病人時，若是需要持續開車或是操作複雜機械時，其能力須定期由治療醫師作評估。
病人接受特定的膽鹼酯酶抑制劑藥品(包括rivastigmine)，心電圖可能出現QT 延長。Rivastigmine 可能導致心搏過緩，這是構成發生torsade de pointes的一項風險因子，主要發生於有風險因子的病人。例如非代償性心臟衰竭，近期曾發生心肌梗塞，緩脈心律不整，低血鉀或低血鎂，有QT 延長的個人病史或家族病史，或是併用已知會引發QT 延長及/或torsade de pointes的藥品。可能也需要臨床監測(ECG)。

不良反應：躁動、混亂、噩夢、焦慮、頭暈、頭痛、嗜睡、顫抖、噁心、嘔吐、腹瀉、食慾不振、腹痛及消化不良、多汗、疲勞無力、心神不寧、體重減輕。

其他詳細產品資訊，請參考衛生福利部核准之產品說明

處方資訊摘要
本藥須由醫師處方使用。
**愷思能穿皮貼片5 Exelon® Patch 5 （rivastigmine 4.6mg/24hr），衛署藥輸字第025234號**
**愷思能穿皮貼片10 Exelon® Patch 10 (rivastigmine 9.5mg/24hr），衛署藥輸字第026029號**

適應症
**輕度至中度阿滋海默氏病之失智症。**
用法用量
以4.6 mg/24 h (Exelon Patch 5，一天一片) 作為起始治療劑量，若耐受性良好且治療情況穩定達四週以上時，醫師可調整劑量為9.5 mg/24 h (Exelon Patch 10，一天一片)。
由膠囊或口服溶液轉換成貼片：已經以3mg膠囊一天兩次治療，若耐受性良好且治療情況穩定達四週以上時，可轉換為Exelon Patch 5$cm^2$一天一片。於穩定之口服6mg膠囊一天兩次治療劑量下，可轉換為Exelon Patch 10$cm^2$一天一片。

禁忌
已知對rivastigmine、其他carbamate衍生物或配方中的賦形劑具敏感性。
過去曾出現黏貼部位反應病史，疑似對rivastigmine穿皮貼片具過敏性接觸性皮膚炎。
警語及使用注意事項/副作用
Exelon Patch曾因用藥錯誤（medication error）而導致發生嚴重的不良事件，應指導病人及照護者Exelon Patch的適當用法用量。
Exelon Patch可能造成胃腸道不良反應，包括噁心、嘔吐、腹瀉、厭食/食慾減退及體重減輕。這些不良反應的發生率和嚴重性與使用的劑量有關，因此，病人應由低劑量開始治療。
使用Exelon Patch具有增加膽鹼作用所引發之其他不良反應，包括錐體外症狀、癲癇發作、消化性潰瘍/胃腸道出血、麻醉作用、迷走神經興奮作用（vagotonic effect）而影響心跳（例如：心跳徐緩）、尿道阻塞、肺部狀態（有氣喘或肺阻塞性疾病病史的病人使用Exelon Patch時要小心）。
使用Exelon patch可能會出現皮膚黏貼部位反應，嚴重程度通常為輕度或中度。這些反應本身並不代表出現過敏，然而使用rivastigmine穿皮貼片可能會造成過敏性接觸性皮膚炎。
病人接受特定的膽鹼酯酶抑制劑藥品(包括rivastigmine)，心電圖可能出現QT 延長。Rivastigmine 可能導致心搏過緩，這是構成發生torsade de pointes的一項風險因子，主要發生於有風險因子的病人。例如非代償性心臟衰竭，近期曾發生心肌梗塞，緩脈心律不整，低血鉀或低血鎂，有QT 延長的個人病史或家族病史，或是併用已知會引發QT 延長及/或torsade de pointes的藥品。可能也需要臨床監測(ECG)。

最常見的副作用為噁心、嘔吐、腹瀉、厭食及體重減輕。

其他詳細產品資訊，請參考衛生福利部核准之產品說明

NOVARTIS 藥商
台灣諾華股份有限公司 地址：台北市中山區民生東路三段2 號8 樓
電 話：02-2322-7777

東竹藥品 經銷商
東竹藥品有限公司 地址：台北市大同區建泰里承德路一段17號16樓之5
電話：02-2559-6994

引用來源：節錄自衛生福利部食品藥物管理署核准之藥品仿單內容。