



阿茲海默症激動症狀-照顧者觀察篩檢量表

阿茲海默症失智症患者可能容易變得心煩、感到挫折或憤怒。這些感受可能與阿茲海默症常見的激動症狀有關。

下列問題詢問的是您可能在照護對象身上觀察到的、與激動相關的行為。

您對這些問題的回答，有助於您與照護對象的醫療專業人員討論。每個問題請選擇一個答案。

患者姓名 _____ 日期 _____

1. 您是否注意到患者出現下列任何不同於平常或過去的行為？

	是	否
a. 重複性動作或行為（例如前後搖晃身體、舉起拳頭、用手指指點）	☐	☐
b. 來回踱步或坐立不安（無法靜止）	☐	☐
c. 咒罵 / 說髒話或言語攻擊	☐	☐
d. 提高音量、大喊或尖叫	☐	☐
e. 抗拒協助或照護	☐	☐
f. 丟擲、敲打或破壞物品	☐	☐
g. 試圖傷害自己或他人（例如：抓、踢、打、咬）	☐	☐

2. 這些行為是否會對患者的人際關係、活動參與或接受照護的意願造成負面影響？

是	否
☐	☐

免責聲明：本篩檢量表是由大塚製藥全球醫療事務部門與多學科專家小組共同開發，並由大塚製藥開發與商業公司贊助。AASC® 是篩檢工具，而非診斷工具。

根據國際老年精神醫學會（IPA）定義的激動標準（Sano 等人，2023 年）

參考資料：1. Clevenger C, et al. One Minute to Recognition: The Agitation in Alzheimer's Screener for Caregivers (AASC®). The Gerontological Society of America Annual Scientific Meeting; November 8-12, 2023; Tampa, FL. 2. Sano M, Cummings J, Auer S, et al. *Int Psychogeriatr*. 2023;1-13.

© 2023 大塚製藥開發與商業公司版權所有，保留所有權利。

August 2024