

110 年度老年精神醫學專科醫師筆試-(釋疑後)

33. 下列關於老年自殺的描述，何者錯誤**正確**？

1. 老年自殺患者有 44-87%罹患憂鬱症，比年輕自殺者比率高。
2. 老年女性及年齡較大的老年人較易出現間接自殺行為，例如：拒絕飲食、不服藥。
3. 大約 15%的老年自殺患者和人格違常有關係，較有意義的是強迫及焦慮特質。
4. 在給予 SSRIs (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors)初期治療的一個月內，比其他抗憂鬱藥物，容易出現自殺的危險性。
5. 研究顯示和血清素活動力下降及血中膽固醇高有關。

選項：

1. A+B+C+D
2. A+B+C+E
3. A+B+D+E
4. A+C+D+E
5. B+C+D+E

答案：1-送分

參考資料：臨床老人精神醫學,二版 2011, P.187&188

45. 關於治療巴金森氏症合併精神症狀，下列何者錯誤**正確**？

- A. 抗精神病藥物使用建議包含 clozapine、olanzapine、quetiapine。
- B. Memantine 治療精神症狀療效優於 Rivastigmine。
- C. Pimavaserin 是 5HT1A receptor 阻劑可有效緩解巴金森氏症精神症狀。
- D. Apomorphine 是 D1-like 與 D2-like agonist 也有部份 5HT2A 拮抗效果，其治療仍待證實。
- E. 若藥物治療反應不佳，可考慮 ECT。

選項：

1. A+B+C
2. A+B+D
3. A+D+E
4. B+C+D
5. C+D+E

答案：3-送分

參考資料：補充資料 ffytche, D. H., & Aarsland, D. (2017). Psychosis in Parkinson's Disease. Nonmotor Parkinson's: The Hidden Face - The Many Hidden Faces, 585 – 622. doi:10.1016/bs.irn.2017.04.005