

社團法人台灣老年精神醫學會

111 年度老年精神醫學專科醫師筆試(釋疑後)

題號	題目
8	<p>有關一般老年人的生理狀態改變，下列何者正確？</p> <p>A. 老年人常因感壓反射(baroreceptor reflex)過強而導致血管收縮過烈。</p> <p>B. 因為老年人的虹膜(iris)血管硬度增加及擴張肌纖維(dilator muscle fiber)萎縮而造成瞳孔直徑較小。</p> <p>C. 老年中耳鼓膜的變薄也是影響耳朵功能變差的因素之一。</p> <p>D. 一般而言，老年交感神經活性較強，此可由血液循環中有較高的正腎上腺素(Norepinephrine)證據支持。</p> <p>E. 老年人的唾液製造下降</p> <p>選項：</p> <p>1. A+B+C</p> <p>2. A+C+D</p> <p>3. B+C+D</p> <p>4. B+D+E</p> <p>5. C+D+E</p> <p>答案：4送分</p> <p>出處：The American Psychiatric Publishing Textbook of Geriatric Psychiatry, 5th ed, 2015, p34-37.</p> <p>說明：依據< American Psychiatric Press Textbook of Geriatric Psychiatry, 5th ed(2015)> BDE 正確，但 E 與[<臨床老年精神醫學> 認為是唾液腺功能無改變。]觀念不一致。雖然有舊研究(1995)支持唾液腺 salivary flow rate 老年人和年輕人無差異，但最近大多數的研究支持 E 是正確。(Nguyen Khanh Toan, Int J Mol Sci. 2021 Jun; 22(11): 5835)。</p> <p>依照考試依照指定教科書規則，此題送分。</p>
24	<p>有關老年憂鬱症的危險因素的陳述，何者組合正確？</p> <p>A. 輕型憂鬱症有較多的人格問題。</p> <p>B. 退縮型 (avoidant) 和依賴型 (dependent)人格障礙症和老年憂鬱症有密切關係。</p> <p>C. 老年憂鬱症和生活事件呈現有意義的關係，僅在缺乏親密關係下才會發生。</p> <p>D. 維生素 B 複合劑和葉酸濃度降低，較易出現老年憂鬱症合併認知功能障礙。</p> <p>E. 單以血清素 (5-HT)和正腎上腺素 (NE)濃度降低並不能解釋憂鬱症的病態生理及療效。</p> <p>選項：</p> <p>1. A+B+C+D</p> <p>2. A+B+C+E</p> <p>3. A+B+D+E</p> <p>4. A+C+D+E</p> <p>5. B+C+D+E</p> <p>答案：5送分</p> <p>出處：臨床老年精神醫學 二版 p.165-167</p>

34	<p>關於老化與人格疾患，下列何者正確？</p> <p>A. 畏避型 (avoidant)人格疾患與較差的鬱症(major depressive disorder)預後有關。</p> <p>B. 較少的社交機會 (social opportunities)與較多的醫療問題(medical illnesses)可能使老人被過度診斷為依賴型(dependent)人格疾患。</p> <p>C. 強迫型(obsessive-compulsive)人格疾患在老年時期通常會較減緩。</p> <p>D. 類分裂型(schizoid)人格疾患的症狀在老年時期通常會持續。</p> <p>E. 反社會型(antisocial)人格疾患在老年族群受刑人的盛行率不會減少。</p> <p>選項：</p> <ol style="list-style-type: none">1. A+B2. A+D3. B+E4. C+D5. C+E <p>答案：5-送分</p> <p>出處：American Psychiatric Publishing Textbook of Geriatric Psychiatry(2015), P494</p>
41	<p>關於老年情感性疾患併發精神病之敘述，下列何者正確？</p> <p>A. 老年精神病患者中，其中 20%~38%為情感性疾患之患者。</p> <p>B. 與年輕憂鬱症患者比較，老年憂鬱症患者以幻覺為主要症狀。</p> <p>C. 與年輕憂鬱症患者比較，老年憂鬱症患者較易併發精神病症狀。</p> <p>D. 與年輕憂鬱症患者比較，老年憂鬱症患者併發精神病症狀時，仍不適用電痙攣治療 (electroconvulsive therapy)，以免產生意識障礙與記憶障礙之後遺症。</p> <p>E. 老年期雙相情感性疾患患者在急性發作時，有將近三分之二併發精神病症狀。</p> <p>選項：</p> <ol style="list-style-type: none">1. A+B+D2. A+B+E3. A+C+D4. B+C+D5. B+D+E <p>答案：3-送分</p> <p>出處：Semniars in Old Age Psychiatry, second edition (2019), P.135, 138</p>

關於臨床失智症評估量表(CDR)，在一般的阿茲海默氏失智症患者評估的敘述上，下列何者正確？

A. CDR=1

	0	0.5	1	2	3
Memory				V	
Orientation			V		
Judgement and Problem solving			V		
Community Affairs			V		
Home and hobby				V	
Personal care				V	

B. CDR=2

	0	0.5	1	2	3
Memory				V	
Orientation				V	
Judgement and Problem solving			V		
Community Affairs				V	
Home and hobby			V		
Personal care			V		

C. 若記憶力得分 >0 ，過半次要項目分數=0，則 CDR=0.5。

D. CDR=1 表示嚴重失智症，此期出現嚴重記憶喪失，無法記得新事物。

E. 阿茲海默氏症功能性評估量表(FAST)和 CDR 可以互換其等級，FAST 第 4 級相當於 CDR=2。

選項：

1. A+C
2. A+D
3. B+C
4. B+D
5. C+E

答案：**5-1**

出處：臨床老年精神醫學，黃正平編(二版, 2011)，P.49, P.50, P.51